

# Hirudoid® forte Gel

MEDINOVA

## **Propriétés/Emploi thérapeutique**

*Qu'est-ce que le gel Hirudoid forte et quand est-il utilisé?*

Le gel Hirudoid forte contient le principe actif héparinoïde semblable à l'héparine. Celui-ci prévient la formation de caillots sanguins et favorise la régression des thrombi déjà existants. Il supprime en outre les processus inflammatoires et l'accumulation de liquide dans les tissus.

Le gel Hirudoid forte est utilisé en cas de:

- prophylaxie des affections veineuses;
- hématomes;
- tuméfactions.

L'application du gel Hirudoid forte atténue contractions et douleurs, réduit tuméfactions et hématomes et soulage la lourdeur dans les jambes. Le gel donne une agréable sensation de fraîcheur.

Cette préparation est également utilisée en cas de

- phlébites superficielles
- inflammations de varices
- traitement consécutif à l'oblitération ou à l'opération de varices

soit sur prescription médicale, soit sur conseil du pharmacien.

## **Complément d'information**

*De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?*

Vous pouvez renforcer l'effet du traitement de votre affection veineuse en pratiquant une activité physique suffisante. La position assise ou debout prolongée provoque des stases et fatigue vos veines. Il convient en outre d'éviter une consommation excessive d'alcool et de tabac, les aliments lourds ou féculents, un excès de poids, ainsi qu'une exposition prolongée au soleil ou une utilisation exagérée du sauna.

Respectez également les conseils de votre médecin, qui en dehors de l'application d'Hirudoid forte concernent p.ex. la gymnastique ou le port de bas de soutien.

## **Contre-indications**

*Quand le gel Hirudoid forte ne doit-il pas être utilisé?*

Le gel Hirudoid forte ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'héparinoïde ou à d'autres composants de la préparation.

## **Précautions**

*Quelles sont les mesures de précaution à observer lors de l'utilisation du gel Hirudoid forte?*

Le gel Hirudoid forte ne doit être appliqué que sur la peau intacte. Veuillez éviter tout contact avec les plaies ouvertes, les yeux ou les muqueuses.

Lors d'affections veineuses dues à un caillot sanguin (thrombo-embolie), il ne faut pas masser.

Si les troubles persistent ou si les symptômes s'aggravent, veuillez absolument consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie,

si vous êtes allergique ou

si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

## **Grossesse/Allaitement**

*Le gel Hirudoid forte peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?*

Si vous êtes enceinte, si vous désirez le devenir ou si vous allaitez, il est préférable d'éviter l'administration de médicaments autant que possible ou de demander l'avis du médecin au préalable. On n'a jamais constaté de risque pour le fœtus ou pour le nouveau-né allaité lors de l'application du gel Hirudoid forte.

## **Posologie/Mode d'emploi**

*Comment utiliser le gel Hirudoid forte?*

Sauf prescription contraire, appliquer plusieurs fois par jour un segment de gel d'une longueur de 3 à 5 cm (et plus en cas de besoin). En cas d'affections thrombo-emboliques, il ne faut pas masser.

Le tube de 100 g ayant une plus grande ouverture, il suffit d'appliquer environ un tiers de la longueur du segment de gel indiqué.

Comme pour tous les gels alcoolisés, il ne faut pas recouvrir le gel Hirudoid forte d'un bandage. Pour une application sous bandage, il est recommandé d'utiliser la crème.

(La feuille d'aluminium se laisse facilement percer avec la pointe fixée dans le capuchon).

Veuillez vous conformer au dosage figurant dans le prospectus. Si vous avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

## **Effets indésirables**

*Quels effets indésirables le gel Hirudoid forte peut-il avoir?*

Le gel Hirudoid forte est en général bien toléré. Chez les patients particulièrement sensibles, de rares cas de réactions d'hypersensibilité cutanée (allergie) ont été observés. Veuillez informer votre médecin, si vous constatez de tels symptômes. En cas de réactions plus importantes, il faut éviter d'appliquer le gel Hirudoid forte.

**Remarques particulières**

*De quoi faut-il en outre tenir compte?*

Le gel Hirudoid forte ne doit être utilisé au-delà de la date imprimée sur l'emballage avec la mention «verwendbar bis».

Les médicaments doivent être conservés au sec et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

**Composition**

1 g de gel contient: Héparinoïde (Chondroïtine polysulfurique) synthétisé de trachées bovines 5 mg corresp. à 400 U.; propylène-glycol; arômes.

**Mode de vente/Présentation**

Le gel Hirudoid forte est disponible en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 40 g et de 100 g de gel.

**Distributeur**

Medinova SA, 8052 Zurich.

**Mise à jour de l'information**

Mai 1998.

---

Ce texte a été approuvé par les autorités et sa publication a été officiellement accordée à la société Documed SA.© Copyright 2008 by Documed SA. Toute utilisation et reproduction sans autorisation est illicite. [10.10.2007]